

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Простатилен®

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.

Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу, если у Вас состояние ухудшилось или улучшение не наступило через 10 дней после начала курса лечения.

Регистрационный номер ЛС-000925

Торговое название препарата Простатилен®

Группировочное название Простаты экстракт

Лекарственная форма суппозитории ректальные

Состав на 1 суппозиторий:

Действующее вещество:

Простаты экстракт (Простатилен®) * 30 мг

(в пересчёте на водорастворимые пептиды 3 мг)

Вспомогательные вещества:

Диметилсульфоксид 90 мг

Макрогол - 400 112 мг

Макрогол-1500 достаточное количество для получения суппозитория массой 2800 мг

* субстанция Простатилен® представляет собой простаты экстракт с добавлением глицина.

Описание: суппозитории торпедообразной формы, от белого до жёлтого цвета, допускается мраморность. На срезе допускается мраморность, наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: простатита хронического средство лечения

Код АТХ: G04ВХ

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:

Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отёка, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, что способствует снижению интенсивности болевого синдрома, уменьшению объёма предстательной железы, улучшению процесса мочеиспускания за счёт увеличения максимальной и средней скорости потока мочи. Снижает уровень лейкоцитов в моче. Стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря, что приводит к увеличению объёма мочи при однократном мочеиспускании. Нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зёрен в секрете ацинусов. Обладает антиагрегантным действием, уменьшает тромбообразование, тем самым препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Повышает качество жизни пациентов.

Показания к применению: хронический абактериальный простатит, состояния до и после операций на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы: ректально. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. По 1 суппозиторию вводят глубоко в задний проход после дефекации или клизмы 1 раз в сутки (утром или вечером) или 2 раза в сутки (утром и вечером). После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут. Курс лечения – не менее 10 дней при хроническом простатите, не менее 15 дней – при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Побочное действие: возможны аллергические реакции (крапивница). В этом случае применение препарата прекращают и назначают антигистаминные средства.

Передозировка: препарат не токсичен, случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

Особые указания: не влияет на способность заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими особого внимания и быстрых реакций, например, управление транспортными средствами.

Форма выпуска: суппозитории ректальные 3 мг. По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из плёнки полимерной: поливинилхлорид/полиэтилен (ПВХ/ПЭ) или поливинилхлорид/поливинилиденхлорид/полиэтилен (ПВХ/ПВДХ/ПЭ). Одна или две контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения. При температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном от детей месте.

Срок годности: 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: отпускают без рецепта.

Производитель/владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей: Акционерное общество «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед». Адрес: Россия 194356, г. Санкт-Петербург, Орлово-Денисовский проспект, д. 14, строение 1, тел.: 8 (800) 505-03-01

www.cytomed.ru

Адрес места производства: 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, д. 57, корп. 4, лит. Ж.